

Ryhy stvola *Plantago lanceolata* agg.

*[English] The goal is to analyze the grooves of the scape of *Plantago lanceolata* agg. and classify individual types.*

*Cieľom je na analyzovať ryhy stvola rastlín skupiny skorocelu kopijovitého (*Plantago lanceolata* agg.) a klasifikovať jednotlivé typy.*

Pri analýze sa analyzovali ryhy stvola vzoriek rastlín zo skupiny skorocela kopijovitého (*Plantago lanceolata* agg.), v septembri/októbri r. 2023 v lokalite obce Vyšný Slavkov (Slovensko) a v jej okolí (východne a severovýchodne od obce), s počtom rýh na stvole väčším ako päť.

Skupina skorocela kopijovitého sa vyskytuje minimálne v nasledujúcich variantoch (východiskový základný prierez stvolu je 5-hrán):

- *jednohranný nevýrazný (unamargo blandus)* – jedna širšia hrana je predĺžená voči ostatným, a má viac ako jednu ryhou, ktoré sú buď skoro úplne strácajúce sa, nevýrazné alebo slabo zreteľné.
- *jednohranný (unamargo)* – jedna hrana je širšia a predĺžená s viac ako len jednou ryhou.
- *dvojhranný (duomargo)* – dve susediace hrany sú širšie a predĺžené s viac ako len jednou ryhou.
- *trojhranný (triamargo)* – tri susediace hrany sú širšie, predĺžené s viac ako len jednou ryhou.
- *jednozárezový (unastria)* – na obvode prierezu stvolu je jeden väčší zárez a potom ďalšie, za sebou, menšie ryhy.

V prípadoch, že sa jedinec nedá jednoznačne zaradiť do žiadnej z vyššie uvedených kategórií alebo sa chce v charakteristiky rastliny niečo zdôrazniť, vtedy môže byť vhodnejšie použiť kombinovaný zápis, napr. „*jednozárezový, 75 % ryhovaný*“ – jedinec s jedným zárezom (t. j. s veľkou ryhou) a s malými ryhami, ktoré zaberajú 75 percent kruhového obvodu stvolu.

Pri identifikovaní jednohraného nevýrazného je vhodné pri analýze druhu:

- preferovať skôr staršie stvoly z trsu,
- analyzovať skôr na dolnej časti stvola,
- pri negatívnom výsledku analyzovať viac ako jeden stvol z daného trsu rastliny.